

Set/Lote:  
Exp./Venc.:

For use in swine only. Store at 35-46°F (2-8°C). Do not freeze. Use entire contents when first opened. Do not treat animals with antimicrobials effective against *Glaesserella spp.* for a period from 72 hours before until 24 hours after administration of this vaccine. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Do not mix with other products, except as specified in the insert. In case of human exposure, contact a physician. Inactivate unused contents before disposal.

**Directions and dosage:** Rehydrate with the accompanying diluent. Inject a single 1 mL dose intramuscularly. See insert for complete information.

**Preservative:** Streptomycin.

See insert for complete information.

Para uso solamente en cerdos. Almacenar a 35-46°F (2-8°C). No congelar. Utilizar todo el contenido una vez abierto. No tratar a los animales con agentes antimicrobianos eficaces contra *Glaesserella spp.* durante un período que abarca de las 72 horas anteriores a las 24 horas posteriores al día de vacunación.

**Glaesserella  
Parasuis Vaccine**  
Avirulent Live Culture  
**Vacuna contra  
Glaesserella parasuis**  
Cultivo vivo no virulento

**ParaSail**

50 Doses, Rehydrate to 50 mL  
50 Dosis, Rehidratar a 50 mL

50  
DOSES



No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. No mezclar con otros productos excepto conforme a lo especificado en el instructivo adjunto. En caso de exposición humana, contactar al médico. Inactivar el contenido no utilizado antes de desecharlo.

**Instrucciones y dosis:** Rehidratar con el diluyente provisto. Inyectar una sola dosis de 1 mL por vía intramuscular. Ver la información completa en el instructivo adjunto.

**Agentes conservantes:** Estreptomicina.

Ver la información completa en el instructivo adjunto.

**Manufactured by/Fabricado por:**  
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.  
St. Joseph, MO 64506  
Phone: 1 (888) 637-4251  
VLN/PCN 124/19J1.00



**Boehringer  
Ingelheim**

174701-01