

BOEHRINGER INGELHEIM

Regulatory Labeling & Graphics - St. Joseph, Missouri USA

CMYK

BLACK-70%

PMS 109

PMS 032

| | | | |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| Revision: | 13 | Type/Size: | Carton/50 Doses |
| Operator: | ars | Template #: | 842 |
| Date: | 09Sep19 | Dimensions: | 3-15/16" x 2-1/16" x 4-1/4" |
| Art #: | 158604-04 | Dieline: | L071796E_C |
| SAP #: | 107283-003 | MASTER: | 158603 |
| Product: | Pyramid 5 | PDF: | 09Sep19 ars |

158604-04

Serial No.:
N° de lote:
Exp. Date:
Fecha de venc.:



50 Doses/Rehydrate to 100 mL
PYRAMID 5

Vacuna contra la Rinotraqueítis-Diarrea Viral-Parainfluenza 3-Virus Sincitial Respiratorio de los Bovinos

Virus Vivo Modificado

PYRAMID 5
con Metastim®

Para uso animal exclusivamente
50 Dosis/Rehidratar a 100 mL

GLUE



Indicaciones: Se ha demostrado que este producto es eficaz para la vacunación de ganado bovino sano, incluyendo vacas gestantes, contra la rinotraqueítis bovina infecciosa (IBR), la diarrea viral bovina tipos 1 y 2 (BVD1 y BVD2), la parainfluenza 3 (PI3) y el virus sincitial respiratorio de los bovinos (BRSV). Este producto obtuvo su licencia antes de que surgiera el requisito para establecer la edad mínima de uso. La duración de la inmunidad contra las enfermedades respiratorias por el BVD tipo 1b es de al menos 217 días. No se ha determinado la duración para los organismos restantes. Para obtener más información sobre los datos de eficacia y seguridad, vaya a productdata.aphis.usda.gov.

Esta vacuna puede ser administrada a vacas gestantes o a becerros amamantados por vacas gestantes siempre y cuando las vacas hayan sido vacunadas antes del servicio, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Ver detalles en el instructivo dentro de la caja.

Instrucciones y dosis: Rehidratar asepticamente con el diluyente provisto. Mezclar bien. Inyectar una dosis de 2 mL por vía subcutánea utilizando una técnica aseptica. Ver el instructivo completas dentro de la caja.

Precauciones: Almacenar a 35-46°F (2-8°C) lejos de los rayos directos del sol. No congelar. No mezclar con otros productos, excepto según lo indicado en esta etiqueta. Utilizar todo el contenido una vez abierto. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Un porcentaje pequeño de los animales puede manifestar una tumefacción leve y transitoria en el sitio de la inyección. En caso de reacción anafilactoidea, administrar epinefrina. En caso de exposición humana, contactar al médico. Inactivar todo el contenido no utilizado antes de desecharlo.

Esta caja contiene un frasco de 50 dosis de vacuna VVM y un frasco de 100 mL de diluyente.

Bovine Rhinotracheitis-Virus Diarrhea-Parainfluenza 3-Respiratory Syncytial Virus Vaccine

Modified Live Virus

PYRAMID 5
with Metastim®

For use in animals only
50 Doses/Rehydrate to 100 mL



Indications: This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy cattle, including pregnant cows, against infectious bovine rhinotracheitis (IBR), bovine virus diarrhea types 1 and 2 (BVD1 & BVD2), parainfluenza 3 (PI3), and bovine respiratory syncytial virus (BRSV). This product was licensed prior to the requirement to establish a minimum age for use. The duration of immunity against respiratory disease due to BVD type 1b is at least 217 days. The duration for the remaining organisms has not been determined. For more information regarding efficacy and safety data go to productdata.aphis.usda.gov.

This vaccine may be used in pregnant cows or calves nursing pregnant cows provided the cows were vaccinated pre-breeding, according to label instructions. See inside box for details.

Directions and dosage: Aseptically rehydrate the vaccine with the accompanying diluent. Mix well. Inject one 2 mL dose subcutaneously using aseptic technique. See inside box for complete directions.

Precautions: Store out of direct sunlight at 35-46°F (2-8°C). Do not freeze. Do not mix with other products, except as specified on this label. Use entire contents when first opened. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. A small percentage of animals may show transient mild injection site swelling. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine. In case of human exposure, contact a physician. Inactivate unused contents before disposal.

This package contains one 50 dose vial of MLV vaccine and one 100 mL vial of diluent.

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
St. Joseph, MO 64506
Phone: 1 (888) 637-4251
VLN/PCN 124/1181.26

Pyramid® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
Metastim® is a trademark of Wyeth LLC. Used under license.
Pyramid® es marca registrada de Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
Metastim® es marca de Wyeth LLC. Utilizada bajo licencia.



158604-04



This product has also been shown to be effective against the development of BVD1 and BVD2 post-challenge viremia and leukopenia; and also against persistent BVD1 and BVD2 infection of the fetal calf when it is used subcutaneously in the cow or heifer 30 to 60 days pre-breeding. This vaccine may be used in pregnant cows or calves nursing pregnant cows provided the cows were vaccinated pre-breeding, according to label instructions, with any Express® FP vaccine, Pyramid 5, Pyramid 10, Pyramid 3, Pyramid 3 + Presponse SQ, or Pyramid 5 + Presponse SQ.

Composition: Contains IBR, BVD1, BVD2, PI3, and BRSV modified live viruses, with Metastim® adjuvant. Gentamicin, neomycin, polymyxin B, and thimerosal added as preservatives.

Directions and dosage: Protect animals from exposure for at least 14 days after vaccination. Contact your veterinarian or the manufacturer for information on revaccination frequency.

Fetal health risks associated with vaccination of pregnant animals with this vaccine cannot be unequivocally determined by clinical trials conducted for licensure. Appropriate strategies to address the risks associated with vaccine use in pregnant animals should be discussed with a veterinarian.

Se ha demostrado que este producto también es eficaz contra el desarrollo de BVD1 y BVD2 la viremia posterior al desafío y la leucopenia; y también contra infecciones persistentes por BVD1 y BVD2 en el feto cuando se administra a vacas o vaquillas o vaquillonas por vía subcutánea entre los 30 y 60 días anteriores al servicio. Esta vacuna puede ser administrada a vacas gestantes o a becerros amamantados por vacas gestantes siempre y cuando las vacas hayan sido vacunadas antes del servicio, siguiendo las instrucciones de la etiqueta, ya sea con cualquier vacuna Express® FP, Pyramid 5, Pyramid 10, Pyramid 3, Pyramid 3 + Presponse SQ, o Pyramid 5 + Presponse SQ.

Fórmula: Contiene virus vivos modificados de IBR, BVD1, BVD2, PI3 y BRSV, con el adyuvante Metastim®. Gentamicina, neomicina, polimixina B y timerosal añadidos como agentes conservantes.

Instrucciones y dosis: Proteger a los animales contra la exposición durante cuando menos 14 días después de la vacunación. Consultar al médico veterinario o al fabricante para obtener información sobre la frecuencia de revacunación.

Los riesgos para la salud del feto asociados con la vacunación de animales gestantes, no pueden determinarse inequívocamente mediante ensayos clínicos realizados para obtener la licencia. Las estrategias apropiadas para analizar los riesgos asociados con la vacunación de animales gestantes, deberán discutirse con un médico veterinario.



GLUE