

BOEHRINGER INGELHEIM

Regulatory Labeling & Graphics - St. Joseph, Missouri USA

Revision:	14	Type/Size:	Carton/50 Doses
Operator:	hal	Template #:	842
RA Labeling:		Dimensions:	3-15/16" x 2-1/16" x 4-1/4"
Date:	16Apr20	Dieline:	L071796E_C
Art #:	158404-02	PDF:	16Apr20 hal
SAP #:	107267-002		
Product:	Pyramid 4		

CMYK

BLACK-70%

PMS 109

PMS 1395

158404-02

Serial No.:
N° de lote:
Exp. Date:
Fecha de venc.:



50 Doses/Rehydrate to 100 mL
PYRAMID® 4

Vacuna contra la Rinotraqueítis-Diarrea Viral-Parainfluenza 3-Virus Sincitial Respiratorio de los Bovinos

Virus Vivo Modificado

PYRAMID® 4
con Metastim®

Para uso animal exclusivamente
50 Dosis/Rehidratar a 100 mL



50 DOSIS



Indicaciones: Se ha demostrado que este producto es eficaz para la vacunación de ganado bovino sano contra enfermedades reproductivas y respiratorias debidas a la diarrea viral bovina tipo 1 (BVD1); y contra la enfermedad respiratoria debida a la rinotraqueítis bovina infecciosa (IBR), la parainfluenza 3 (PI3), y el virus sincitial respiratorio de los bovinos (BRSV). Este producto obtuvo su licencia antes de que surgiera el requisito para establecer la edad mínima de uso. No se ha determinado la duración de la inmunidad. Para obtener más información sobre los datos de eficacia y seguridad, vaya a productdata.aphis.usda.gov. Se ha demostrado que este producto también es eficaz contra infecciones persistentes por BVD1 y BVD2 en el feto cuando se administra a vacas o vaquillas o vaquillonas por vía subcutánea entre los 30 y 60 días anteriores al servicio.

Fórmula: Contiene virus vivos modificados de IBR, BVD1, PI3, y BRSV VVM, con el adyuvante Metastim®. Gentamicina, neomicina, polimixina B y timerosal añadidos como agentes conservantes.

Instrucciones y dosis: Rehidratar asepticamente con el diluyente provisto. Mezclar bien. Inyectar una dosis de 2 mL por vía subcutánea utilizando una técnica aséptica. Proteger a los animales contra la exposición durante cuando menos 14 días después de la vacunación. Consultar al médico veterinario o fabricante para obtener información sobre la frecuencia de revacunación.

Precauciones: Almacenar a 35-46°F (2-8°C) lejos de los rayos directos del sol. No congelar. No mezclar con otros productos, excepto según lo indicado en esta etiqueta. Utilizar todo el contenido una vez abierto. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Un porcentaje pequeño de los animales puede manifestar una tumefacción leve y transitoria en el sitio de la inyección. En caso de reacción anafilactoidea, administrar epinefrina. No administrar a las vacas gestantes ni a los becerros amamantados por vacas gestantes. En caso de exposición humana, contactar al médico. Inactivar todo el contenido no utilizado antes de desecharlo. Esta caja contiene un frasco de 50 dosis de vacuna VVM y un frasco de 100 mL de diluyente.

Bovine Rhinotracheitis-Virus Diarrhea-Parainfluenza 3-Respiratory Syncytial Virus Vaccine

Modified Live Virus

PYRAMID® 4
with Metastim®

For use in animals only
50 Doses/Rehydrate to 100 mL



50 DOSIS



Indicaciones: This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy cattle against reproductive and respiratory disease due to bovine virus diarrhea type 1 (BVD1); and against respiratory disease due to infectious bovine rhinotracheitis (IBR), parainfluenza 3 (PI3), and bovine respiratory syncytial virus (BRSV). This product was licensed prior to the requirement to establish a minimum age for use. The duration of immunity has not been determined. For more information regarding efficacy and safety data, go to productdata.aphis.usda.gov.

This product has also been shown to be effective against persistent BVD1 and BVD2 infection of the fetal calf when it is used subcutaneously in the cow or heifer 30 to 60 days pre-breeding.

Composition: Contains IBR, BVD1, PI3, and BRSV modified live viruses, with Metastim® adjuvant. Gentamicin, neomycin, polymyxin B, and thimerosal added as preservatives.

Directions and dosage: Aseptically rehydrate the vaccine with the accompanying diluent. Mix well. Inject one 2 mL dose subcutaneously using aseptic technique. Protect animals from exposure for at least 14 days after vaccination. Contact your veterinarian or the manufacturer for information on revaccination frequency.

Precautions: Store out of direct sunlight at 35-46°F (2-8°C). Do not freeze. Do not mix with other products, except as specified on this label. Use entire contents when first opened. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. A small percentage of animals may show transient mild injection site swelling. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine. Do not use in pregnant cows or in calves nursing pregnant cows. In case of human exposure, contact a physician. Inactivate unused contents before disposal.

This package contains one 50 dose vial of MLV vaccine and one 100 mL vial of diluent.
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
St. Joseph, MO 64506
Phone: 1 (888) 637-4251
VLN/PCN 124/1181.25



Pyramid® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
Metastim® is a trademark of Wyeth LLC. Used under license.
Pyramid® es marca registrada de Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
Metastim® es marca de Wyeth LLC. Utilizada bajo licencia.



158404-02

GLUE