





CÓMO COLOCAR CORRECTAMENTE EL SELLADOR DE PEZONES LOCKOUT®.


Siga estos pasos para obtener los mejores resultados en un protocolo de secado.




1
Verifique que cada cuarto se haya ordeñado por completo. Cuando utilice un antibiótico durante el secado, adminístrelo primero de acuerdo con la etiqueta.




2
Es fundamental mantener una higiene adecuada. Recuerde mantener las jeringas limpias y reemplace o desinfecte los guantes desechables entre una vaca y otra o cuando estén sucios. **NO** sumerja las jeringas en agua antes de usarlas.




3
Moje los pezones con solución germicida. Deje transcurrir 30 segundos de contacto. Seque cada pezón con una toalla limpia.




4
Frote los extremos de cada pezón con una almohadilla humedecida en alcohol al 70 %, comenzando por los pezones que se encuentran más lejos.




5
Retire la tapa del tubo de sellador de pezones interno sin antibióticos LOCKOUT, con la precaución de no tocar la punta del tubo y mantener la higiene adecuada.




6
Tome el pezón desde el lugar en que se une a la base de la ubre. Esto ayudará a colocar la pasta LOCKOUT en el canal del pezón.



7
Aplique la técnica de inserción parcial, comenzando por el pezón que se encuentre más cerca (en el orden inverso en que los limpió). **RECUERDE** que el émbolo solo se desplaza media pulgada.




8
Deposite una pequeña cantidad de sellador en el canal del pezón a medida que retira la jeringa. **NO** haga que el sellador de pezones LOCKOUT ingrese en la ubre con masajes.




9
Aplique un desinfectante para después del ordeño.

RETIRO


Siga estos pasos para retirar LOCKOUT durante la parición.



1
No retire LOCKOUT con una máquina de ordeño. En el parto, presione y estire cuidadosamente cada pezón de 10 a 12 veces desde la parte superior hacia abajo antes del ordeño*.



2
Identificación: LOCKOUT es el primer sellador de pezones interno sin antibióticos que presenta una pasta azul visible y fácil de distinguir de la leche durante su extracción. **Si observa restos de color azul, significa que hay más sellador de pezones y se debe retirar.**



3
Ordeñe las vacas recién paridas en tarros durante un mínimo de tres ordeños, según los procedimientos posparto. Consulte la información importante acerca del retiro que se encuentra a continuación.

INFORMACIÓN DE RETIRO:

Cuando se usa solo, LOCKOUT no requiere de un período de descarte de la leche ni de retiro previo al sacrificio. Si el tratamiento de la vaca seca se usa junto con LOCKOUT, respete los tiempos de retiro de antibiótico recomendados en el prospecto.

*Deseche el producto no utilizado o el sellador extraído del animal de acuerdo con los requisitos federales, estatales y locales.

LOCKOUT® es una marca comercial registrada de Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. ©2019 Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, GA. Todos los derechos reservados.
US-BOV-0509-2021-SPAN

lockout®

LockoutTeatSealant.com