


Boehringer  
Ingelheim

Revision . . . . .	9	Type/Size . . . . .	Carton / 10 Ds., 20 mL
Operator . . . . .	hal	Template # . . . . .	841
Date . . . . .	26Feb13	Dimensions . . . .	3" x 1-9/16" x 2-7/8"
Art # . . . . .	158802-01	PDF . . . . .	27Feb13 hal
Item # . . . . .	558801	Rev Level . . . . .	01
Product . . . . .	Pyramid 10	Master . . . . .	158801

BLACK  
BLACK - 70%  
PMS 287  
PMS 107  
VARNISH

Dieline: M091002M\_B



10-208801

Serial No.:  
N° de lote:  
Exp. Date:  
Fecha de venc:

10 Doses / Rehidratar a 20 mL  
10 Doses / Rehydrate to 20 mL

PYRAMID® 10

Glue

Vacuna contra la Rinotraqueítis-Diarrea Viral-Parainfluenza 3-Virus Sincitial Respiratorio de los Bovinos, Virus Vivo Modificado, Bacterina contra Leptospira Canicola-Grippytyphosa-Hardjo-Icterohaemorrhagiae-Pomona

PYRAMID® 10  
Uso Veterinario  
10 Dosis / Rehidratar a 20 mL



Este caja contiene un frasco de 10 dosis de vacuna VVM y un frasco de 20 mL de diluyente.

**Indicaciones:** Para la vacunación de ganado bovino sano como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por la diarrea viral bovina (tipos 1 y 2), la parainfluenza 3 bovina, el virus sincitial respiratorio de los bovinos, *L. canicola*, *L. grippytyphosa*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae*, y *L. pomona*, y como ayuda en la reducción de la enfermedad causada por el virus de la rinotraqueítis bovina. Este producto ayuda en la prevención de las infecciones persistentes de diarrea viral bovina tipo 1 y tipo 2 en el feto cuando se administra a vacas o vaquillas o vaquillonas por vía subcutánea entre los 30 y 60 días antes del servicio. Esta vacuna puede ser administrada a vacas gestantes o a becerros amamantados por vacas gestantes siempre y cuando las vacas hayan sido vacunadas antes del servicio, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Ver detalles en el prospecto.

**Fórmula:** Contiene virus vivos modificados de IBR, BVD tipos 1 y 2, PI3 y BRSV, y *L. canicola*, *L. grippytyphosa*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae*, y *L. pomona* inactivados, con el adyuvante Metastim® y neomicina, polimixina B y timerosal como agentes conservantes.

**Dosis y administración:** Ver el prospecto.

**Precauciones:** Almacenar en la oscuridad a 35 - 45°F (2 - 7°C). Evitar la congelación. Utilizar todo el contenido una vez abierto. Un porcentaje pequeño de los animales puede manifestar una tumefacción leve y transitoria en el sitio de la inyección. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Incinerar el recipiente y todo el contenido no utilizado. En caso de reacción anafiláctica, administrar epinefrina.

Bovine Rhinotracheitis-Virus Diarrhea-Parainfluenza 3-Respiratory Syncytial Virus Vaccine, Modified Live Virus, Leptospira Canicola-Grippytyphosa-Hardjo-Icterohaemorrhagiae-Pomona Bacterin

PYRAMID® 10  
For Veterinary Use Only  
10 Doses / Rehydrate to 20 mL



This package contains one 10 dose vial of MLV vaccine and one 20 mL vial of diluent.

**Indications:** For vaccination of healthy cattle as an aid in the prevention of disease caused by bovine virus diarrhea (types 1 and 2), bovine parainfluenza 3, bovine respiratory syncytial virus, *L. canicola*, *L. grippytyphosa*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae*, and *L. pomona*, and as an aid in the reduction of disease caused by bovine rhinotracheitis virus. This product aids in the prevention of persistent BVD type 1 and type 2 infection of the fetal calf when it is used subcutaneously in the cow or heifer 30 to 60 days pre-breeding. This vaccine may be used in pregnant cows or calves nursing pregnant cows provided the cows were vaccinated pre-breeding, according to label instructions. See insert for details.

**Composition:** Contains IBR, BVD types 1 and 2, PI3, and BRSV modified live viruses, and inactivated *L. canicola*, *L. grippytyphosa*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae*, and *L. pomona*, with Metastim® adjuvant, and neomycin, polymyxin B, and thimerosal as preservatives.

**Dosage and administration:** See insert.

**Precautions:** Store in the dark at 35 - 45°F (2 - 7°C). Avoid freezing. Use entire contents when first opened. A small percentage of animals may show transient mild injection site swelling. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Burn container and all unused contents. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine.

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.  
St. Joseph, MO 64506  
US Vet. Lic. No. 124  
Lic. Vet. de EE.UU. N° 124  
Code 158-811



158802-01



Pyramid® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.  
Metastim® is a trademark of Wyeth LLC. Used under license.