

DOSING GUIDE

GUÍA DE DOSIS

Cattle Body Weight (bw) Peso corporal del ganado (bw)	Dosage/head – Dosis/cabeza 5 mg/lb bw – 5 mg/lb de peso corporal
100 lb	2 mL
200 lb	4 mL
400 lb	8 mL
800 lb	16 mL
1000 lb	20 mL
1200 lb	24 mL
1400 lb	28 mL
1500 lb	30 mL
1600 lb	32 mL

Mixing, Administration and Storage:

1. Transfer 79 mL of sterile water into the bottle of POLYFLEX.
2. Gently shake the bottle to rehydrate 100 mLs of POLYFLEX.
3. Administer intramuscular at 2 mL per 100 lbs. bodyweight.
4. After rehydration, store in a refrigerator for up to 3 months.

Residue Warnings: Do not treat cattle for more than 7 days. Milk from treated cows must not be used for food during treatment, and for 48 hours (4 milkings) after the last treatment. Cattle must not be slaughtered for food during treatment, and for 144 hours (6 days) after the last treatment.

Mezcla, administración y almacenamiento:

1. Transfiera 79 ml de agua estéril a la botella de POLYFLEX.
2. Agite delicadamente la botella para rehidratar 100 ml de POLYFLEX.
3. Administre por vía intramuscular a 2 ml por 100 lb de peso corporal.
4. Después de la rehidratación, almacene en un refrigerador por hasta 3 meses.

Advertencias de residuos: No tratar el ganado durante más de 7 días. No se debe consumir la leche de vacas tratadas durante su tratamiento y durante 48 horas (4 ordeños) después del término del tratamiento. No se debe sacrificar ganado con fines alimentarios durante el tratamiento y durante 144 horas (6 días) después del término del tratamiento.



Cattle First.

